

EN QUÊTE DES PAPILLONS EMBLÉMATIQUES DU LOT

LES CAUSSES
DU QUERCY



LES OBSERVATOIRES CITOYENS DU PARC — GÉOPARC



LES OBSERVATOIRES CITOYENS DU PARC — GÉOPARC, UN OUTIL PARTICIPATIF !

Le Parc naturel régional — Géoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy a pour mission de protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel du territoire. Pour l'accompagner et accroître ses connaissances, il fait appel aux citoyens. En participant à cet observatoire, vous contribuez à la collecte de données et aidez à étudier l'état de la biodiversité de notre territoire.

COMMENT PARTICIPER ?

C'est très simple : lorsque vous observez l'une de ces espèces connectez-vous sur www.parc-causses-du-quercy.fr/observatoires et enregistrez votre observation ! Pas besoin d'être un expert : vous avez devant vos yeux l'outil nécessaire pour identifier cette espèce. Accompagnées d'une **photo**, vos données seront plus facilement validées.



POURQUOI UNE ENQUÊTE SUR CES PAPILLONS DE JOUR ?

Une meilleure connaissance de la répartition de ces papillons permet de mettre en œuvre une gestion adaptée des milieux dans lesquels ils vivent, profitant également à une multitude d'autres espèces. Le suivi de ces populations sur le long terme constitue un outil important pour évaluer l'état des milieux naturels et l'efficacité des actions de conservation et de renaturation.

OÙ ET COMMENT LES OBSERVER ?

On peut repérer les papillons par la végétation. En effet, les papillons ont tous des **plantes préférentielles** appelées « **plantes hôtes** ». En les observant, elles nous donnent un indice de la présence potentielle du papillon.

L'Hermite *Chazara briseis*

Ce papillon de nuit discret, de teintes claires tachées de marron, est observé sur les pelouses sèches bien exposées au soleil, à végétation basse et éparse, souvent rocailleuses. Il est visible volant près du sol et se posant sur des pierres pour se camoufler. Il a pu être observé sur le causse de Gramat.



Envergure : 45 - 71 mm

Plantes hôtes :

- * Sesslerie blanchâtre, Sesslerie bleue
- * Groupe des Fétuques
- * Palingre, Brachypode rupestre

Périodes d'observations optimales

L'Hermite

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Forte probabilité d'observation

 Observation probable

Création : Caroline Tremesaygues - Impression : Champagnac - 06 / 2025

Les quatre espèces de papillons sont classées en listes rouge
des espèces menacées mondiale, française ou régionale.



Pour éviter toute confusion lors des observations, voici des espèces semblables à ces papillons et leurs critères distinctifs :

ATTENTION À NE PAS LES CONFONDRE !

La Laineuse du Prunellier *Eriogaster catax*:

Souvent observée sous sa forme de chenille couverte de poils blancs, noirs et bruns, l'espèce fréquente les landes calcaires parsemées d'arbustes. Les groupes de chenilles y tissent un « nid » en avril et mai de soies blanches d'environ 15 centimètres qui est utilisé comme solarium. Aux derniers stades, elles se déplacent et se chrysalident au sol et au centre d'un fourré. Il en émerge un papillon que l'on voit voler en début de nuit au sein de ces milieux à faciès arbustifs. Les deux sexes présentent des différences de couleurs avec un mâle orangé et une femelle plutôt brunâtre.



Envergure : Mâle 30 - 36 mm / Femelle 38 - 45 mm

Plantes hôtes :

- * Arbustes de landes calcaires de type Aubépine, Prunellier

L'Aurore de Provence *Anthocharis euphenoides*

Ce papillon jaune aux pointes des ailes orange pour le mâle et blanchâtre pour la femelle est spécifique aux milieux méditerranéens. Il fréquente les prairies, pelouses et lisières. Les mâles, visibles au printemps, patrouillent à la recherche des femelles. Les œufs sont pondus sur des crucifères (brassicacées) sauvages dans des milieux plutôt secs comme sur le Quercy blanc.



Envergure : Mâle 30 - 36 mm / Femelle 38 - 45 mm

Plantes hôtes :

- * Sisymbre officinal, Herbe aux chantres
- * Biscutelle lisse, Lunetière lisse, Lunetière lisse

Le Cuivré des marais *Lycaena dispar*

Ce petit papillon aux ailes orangées, a le dessous des ailes orange vif, bordées de gris, ornées d'arcs de points noirs et avec à leur base des teintes bleutées. Il est typique des prairies humides, prairies de fauche de fond de vallées (vallées de l'Ouyssou ou du Vers notamment).

Envergure : 35 - 40 mm

Plantes hôtes :

- * Oseilles et Patiences types Oseille géante, Oseille
- * Pulicaire commune
- * Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau



Périodes d'observations optimales

La Laineuse du Prunellier

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

L'Aurore de Provence

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Le Cuivré des marais

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Forte probabilité d'observation

 Observation probable

 Observation des chenilles



Laineuse du prunellier

(*Erigaster catax*)



chenille sur sa plante hôte, l'oseille crépie (*Rumex crispus*)




Cuivré des marais (*Lycena dispar*)




chenille sur sa plante hôte, le prunellier (*Prunus spinosa*)



taille réelle



Vue de profil



Vue de dessus

taille réelle



Vue de dessus

Hermite (*Chazara briseis*)



Vue de profil



chenille sur sa plante hôte, la fétuque (*Festuca* sp.)

Vue de dessous



Vue de profil



Vue de dessus

taille réelle



Aurore de Provence (*Anthocharis euphenoides*)